



Fiskehelse og biosikkerhetsplan

Avdeling:	Matfisk
Navn på firma og område:	Cermaq Norge, Steigen kommune
Gjelder lokalitet:	11312, Svartfjell,
Ansvarlig	Tommy Olsen
Versjon nr:	1
Sist revidert:	05.12.2022
Signatur Regionansvarlig Fiskehelse Nordland	Elisabeth Faureng <i>Elisabeth Faureng</i>

Formål:

- Bidra til en stabil og god produksjon som ivaretar fiskens helse og velferd
- Minske sannsynligheten for introduksjon av utvalgte smittestoff
- Bidra til å unngå etablering og spredning av smitte internt i anlegget, til andre akvakulturanlegg eller villfisk

Biosikkerhetsplanen skal finnes på lokaliteten, og gjelder til enhver tid for all båttrafikk og personale på lokaliteten, inkludert besøkende.

Biosikkerhetsplanen gjennomgås årlig og oppdateres hvis forutsetninger eller helsesituasjonen endrer seg.

Biosikkerhetsplanen skal være signert av regionansvarlig fiskehelse Nordland.

Emneoversikt

Biosikkerhetsplan	1
Biosikkerhet i matfiskproduksjon	3
Biosikkerhet Svartfjell.....	4
Biosikkerhet, (orden, renhold og hygiene)	8
Holde fisken sunn.....	9
Holde patogener ute	9
Minimalisere spredning av sykdom internt i anlegget.....	10
Sykdomsutbrudd/akutt dødelighet.....	10
Vannkvalitet	11
Virussykdommer: IPN, PD, ILA, HSMB, CMS.....	12
Bakteriesykdommer: Furunkulose, Vibriose, Kaldtvannsvibriose, Vintersår, Tenacibaculose	12
Kontroll på lakselus og skottelus.....	13
Overvåking av fiskehelsestatus	14
Dokumentasjon/ registreringer fiskehelse	14

Biosikkerhet i matfiskproduksjon

Biosikkerhet i matfiskoppdrett dreier seg først og fremst om kontroll med smittsomme sykdommer gjennom å hindre introduksjon og spredning av smitte, samt overvåking og sanering etter smitteutbrudd. God biosikkerhet styrker helsen og velferden til laksen.

Vanlige smitteveier

1. **Vertikal smitte.** Sykdomsagens som kan overføres via kjønnsprodukter (melke eller rogn) fra foreldre til avkommet
2. **Horisontal smitte.** Sykdomsagens overføres fra fisk til fisk, enten ved direkte kontakt, overflatesmitte på kjønnsprodukter eller via vannet. Kan også forekomme via passiv smitte med gjenstander eller utstyr
3. **Vektorbåren smitte.** Smitte via en bærerorganisme, f.eks. lakselus, fugler eller andre organismer som kan bære smitten mellom mottakelige individer

Størst risiko for introduksjon og spredning av smitte i matfiskanlegg er ved direkte kontakt med eller inntak av smittet fisk, smitte via sjøvann eller fra båter og utstyr som ikke er tilstrekkelig rengjort og desinfisert. Smitte kan og komme med predatorer og andre organismer som forflytter seg mellom fisk og anlegg. Det anses som usannsynlig med smitte fra luft til fisk, dvs. via bekledning eller aerosoler (dråper). Ved daglig røkting med håndtering av dødfisk og svekket fisk (svimere), vil smitte med all sannsynlighet kunne overføres til arbeidstøyet. Det er derimot svært usannsynlig at smitte fra arbeidstøy skal nå fisken med mindre det benyttes vått og skittent arbeidstøy og at vedkommende faller i havet. Det er uansett viktig med god hygiene i alle ledd i matfiskproduksjon.

I denne planen er de første sidene lokalspesifikke for Svartfjell, mens tekstboksene fra s. 7 er omhandler biosikkerhet på mer overordnet nivå.

Biosikkerhet Svartfjell

Geografi, anlegg, miljø mm

Svartfjell ligger i sagfjorden og driftes med åpent merdanlegg, dvs. not som avgrensing mot ytre miljø. Taknett og hoppegjerde reduserer faren for rømming og skal holde ville dyr ute, både predatorer og f.eks. måke og kråke som i all hovedsak jakter på fôr. Anlegget har kun taknettstenger. Stang på taknettstenger er flyttet så de står oppreist frå gangbanen. Med denne modifikasjonen hindrer man ved sterkt vær at nett går i fôrspreder og sjø. Anlegget har smoltposer på enkelte merder, ellers kombiposer. Anlegget bytter kombiposer til storfiskposer når fisken er stor nok > 700g.

Luseskjørt med 5 m dybde benyttes fra utsett og frem til slakt om det er mulig og hensiktsmessig. Luseskjørtene bidrar til reduksjon i påslag av lakselus og gir et roligere miljø i øvre vannsøyle. Dette er gunstig spesielt for den minste fisken i de første ukene til månedene etter utsett. Videre er det en ekstra barriere mellom laksen og ytre miljø, inkl. ville dyr/organismer.

I perioder med lavt eller ustabil oksygeninnhold i havet, kan det være nødvendig å heve skjørtene i kortere eller lengre tid for å ivareta fiskevelferden.

Basen er på fôrflåte med bodel. Bodel bruker per i dag ikke.

Lokaliteten har vært i drift over flere generasjoner og vist seg godt egnet. Lokaliteten ligger i Sagfjorden, lengderetning nord/sør. Strømretning treffer på tvers i anlegget, og kan tidvis bli sterk. Tidlig høst kan være en værhard periode, og dette hensyntas i forbindelse med smoltutsett. Vest/nordvest er den vindretning som treffer anlegget hardest. Det har ikkje historisk vært utfordringer med ising.

Lokaliteten har koordinert brakklegging og samordnet plan for lusebekjempelse sammen med Veggfjell, Oksøy, Horsvågen/ Anevika, Ørnhaugneset, og Hammer.

Se vedlegg 4- samordnet plan for lusebekjempelse. I tillegg til lokaliteter i samme fjordsystem er ventemerdd slakteri Steigen lokalisert i sagfjordsystemet.

Lokalitetene som omfattes av denne planen er lokalisert rundt Svartfjell i Steigen kommune. Basert på geografi i området, er det naturlig å definere området som én koordineringssone.

Det har de siste to generasjoner vært påvist CMS. Det er vanskelig å påvise om dette er linket til miljø eller settefiskleverandør.

Miljøundersøkelser siste generasjonar har vært gode. Anlegget modellerer plassering av fisk med hensyn til disse.



Smolt

- All smolt skal være vaksinert med godkjent vaksine mot IPNV, furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose og vintersår forårsaket av *Moritella viscosa* og ha oppnådd immunitet før mottak. Vaksine med ILAV komponent benyttes ved behov.

- All smolt skal være screenet for relevante patogener før mottak. Relevante patogener risikobaseres av fiskehelse.

PRV/ PMCV opptrer tilnærmet endemisk. Dvs. at vi høyst sannsynlig vil finne fisk som er positive en eller flere ganger i løpet av produksjonstiden i sjø uten at vi nødvendigvis får påvist sykdom eller dødelighet knyttet til disse smittestoffene.

Konsekvens ved påvist smitte inngår i risikovurderingen før utsett og vi vurderer ut fra prevalens (andel fisk smittet), smitte stadium (friske smittebærere eller aktivt virus/sykdom), helsestatus generelt og fare for introduksjon av smitte til Svartfjell og smitte videre til nabolokaliteter. Syk fisk skal ikke settes ut mens utsett av grupper med lav prevalens og lav smitte (friske smittebærere) vurderes som akseptabelt. På lang sikt håper vi å kun sette ut smittefri smolt.

- Før utsett skal det gjøres ei risikovurdering hvor biosikkerhet inngår som et sentralt element sammen med fiskehelse og -velferd.

- Transport av smolt skal foregå med bruk av utvalgte brønnbåter

- Lokaliteten er ikke spesielt utsatt for spesielle patogener

Besøkende og personell

- Personell og alle besøkende skal sluses inn og forlate anlegget via hovedinngangen.
- Besøkende skal signere besøksprotokolen som skal ligge lett tilgjengelig.
- Personell skal ved arbeid ute på merdanlegget benytte inngangen til garderobeområdet og skal bruke ytterbekledning inkl. fottøy fra bedriften, alt etter årstid.
- Besøkende som skal ut på merdanlegget og som skal i kontakt med fisken eller utstyr som står i vann, skal fortrinnsvis benytte ytterbekledning inkl. fottøy utlånt fra lokaliteten. Unntak fra kravet om ytterbekledning vil normalt gjelde personell på brønnbåt og andre servicebåter som stiller i egen bekledning.
- Besøkende som ikke skal i kontakt med fisken eller utstyr i vann på merdanlegget, kan benytte egne arbeidsklær inkl. fottøy dersom disse anses egnet.
- Eget arbeidstøy som besøkende får benytte ute på merdanlegget skal være rent og tørt
- Bekledning inkl. fottøy og pålagt verneutstyr til utlån på lokaliteten skal vaskes etter bruk og være i god stand.

Båter og båttrafikk

- Lokaliteten disponerer en arbeidsbåt.
- Arbeidsbåten skal vaskes og desinfiseres daglig.
- All unødig båttrafikk skal unngås, dette gjelder også internt.
- For fritidsbåter, fiskebåter o.l. gjelder ferdselsforbudet innenfor 200 m fra anlegget.
- Ved all båttrafikk inn til anleggssonen skal biosikkerhetsplan for PO9 følges, se vedlegg.
- Bruk av båter i fast charter er å foretrekke.
- Ved større operasjoner som f.eks. avlusing kan det være nødvendig å ta inn arbeidsbåter fra andre lokaliteter i CN. Før båtene kommer inn i merdanlegget skal de være vasket og desinfisert og alt unødig utstyr skal være fjernet som f.eks. stamper eller kar til dødfiskhåndtering, håndhåver mm. Når båtene forlater Svartfjell, skal de vaskes og desinfiseres før de går tilbake til egen lokalitet.

Utstyr

- Lokaliteten skal disponere alt utstyr som trengs til daglig drift, inkl. kar til lusetelling.
- Alt utstyr skal vaskes og desinfiseres etter bruk.
- Nøter er coated og spyling/ rengjøring gjennomføres for å holde et godt merdmiljø, og unngå unødig groe og vekst.
- Håndhåv brukt til opptak av dødfisk skal ikke benyttes til svimerplukking i etterkant.
- Utstyr som brukes i sjøen i kontakt med fisk skal i hovedregelen ikke lånes ut til eller lånes fra andre lokaliteter. Dersom det likevel er helt nødvendig å låne utstyr skal det være rengjort og desinfisert før det tas inn eller forlater lokaliteten. Det skal ikke under noen omstendighet

lånes ut utstyr eller lånes utstyr fra lokaliteter ved mistanke om eller påvist alvorlig sykdom (typisk PD eller ILA)

- Utstyr skal ikke lagres i umiddelbar nærhet av dødfiskkverna og lasting/lossing av utstyr skal ikke foregå i dette området av flåta når det er fisk i anlegget

Dødfisk, opptak og håndtering

- Dødfisk skal fjernes hver dag og ved behov, flere ganger daglig.
- Det skal benyttes egne stamper/kar som er tette, ingen avrenning tolereres.
- Dødfisk skal kvernes og ensileres fortløpende etter opptak. Dødfisk skal ikke lagres i kar eller på annen måte før ensilering.
- Ensilasjen skal være merket med rett kategori og leveres til godkjent mottaker.
- Det er kun fisk og fiskeavfall som skal i ensilasjen. Annet biologisk avfall skal håndteres på annen måte.
- Området rundt kverna og utstyr som er brukt skal vaskes og desinfiseres etter bruk.
- Dersom mengden dødfisk overstiger kapasiteten på anlegget skal CN stille med nødvendig kapasitet. Om nødvendig skal det benyttes ensilasjebåt for å forhindre opphoping av dødfisk i mærene eller i kar.
- Ved mistanke om eller ved påvist sykdom eller ved økt uavklart dødelighet, skal friske mærer røktes først og syke mærer røktes sist. Utstyr brukt i friske mærer skal holdes atskilt fra utstyr som benyttes i syke mærer
- Dødfisk skal håndteres på lokaliteten, det skal ikke fraktes dødfisk til annen lokalitet for ensilering

Biosikkerhet, (orden, renhold og hygiene)

Formål:

Holde et rent og trygt miljø for fisken og redusere eksponering mot, introduksjon og spredning av smittsomme sykdommer

Forebyggende tiltak:

- Båter, flåter og anlegg skal holdes ryddig og rene. Renholdsplan skal følges (nivå grønn)
- Utstyr som brukes til dødfisk skal være adskilt fra utstyr som brukes på levende fisk eller være tilstrekkelig rengjort og desinfisert før bruk på levende fisk
- Unødig trafikk av eksterne båter i anlegget eller besøkende skal unngås
- Alle besøkende og ansatte, skal sluses inn i anleggssonen

Korrigerende tiltak:

- Beredskapsplanverk
- Renholdsplanrød sone

Ansvar:

Driftsleder

Prosedyre – dokumentnummer

Alarmplan lokalitet og Beredskapsplan for Cermaq Norway – 1154

Prosedyre for risikovurdering- 366

Kompetansekrav matfisk og servicebåt- 382

Hygienereglement matfisk- 127

Prosedyre for renhold matfisk og Servicebåt – 367

- Renholdsplan flåte/ landbase- 369

- Renholdsplan båt- 373

- Renholdsplan ensilasje og dødfiskutstyr- 374

Prosedyre for daglig ettersyn og røkting matfisk- 341

Prosedyre for håndtering av dødfisk, svimere og ensilasje- 289

Prosedyre for ekstern båttrafikk i anlegget- 222

Prosedyre for besøkende matfisk- 146

Kravspesifikasjon eksterne smoltleverandører- 479

Prosedyre for renholdskontroll av brønnbåt ved smoltføringer- 355

Prosedyre for brønnbåt inn og ut av sykdomssoner – 1334

Prosedyre for levering og mottak av smolt- 319

Prosedyre for kontroll ettersyn og renhold av not- 315

Prosedyre for driftsplan og rapportering om drift matfisk- 213

Prosedyre for helsekontroll i Cermaq Norway- 280

Prosedyre for ivaretagelse av fiskevelferd og helse i Cermaq Norway- 1210

Prosedyre for Real- time RT-PCR screening- 352

Prosedyre for montering, ettersyn og vedlikehold av anlegg matfisk- 273

Holde fisken sunn

Formål:

Å holde fisken så sunn som mulig er viktig for å holde sykdom ute eller redusere risikoen for spredning av sykdom

Forebyggende tiltak:

- Kontroll med predatorer utføres fortløpende og ved behov
- Fisken skal ha tilgang på rett mengde med fôr hver dag. Fôr skal være tilpasset størrelse og livsstadium
- Helsefôr for å forebygge påslag av lakselus, utvikling av sår eller redusere omfanget av hjerterelaterte lidelser kan kun brukes etter avtale med produksjonsledelsen og Fiskehelseavdelingen
- Unødig håndtering og stressbelastninger skal unngås

Korrigerende tiltak:

- Hvis fiskens helsetilstand tilsier dette kan man benytte helsefôr i en lengre periode
- Medikamentell behandling benyttes kun hvis foreligger indikasjon (bekreftet diagnose) og etter forskrivning av fiskehelsepersonell.
- Ved økt dødelighet/sviming skal frekvensen på plukking av dødfisk og svimere økes

Ansvar:

Driftsleder

Prosedyre – dokumentnummer

Samme referanser som under biosikkerhet

Prosedyre for samspill med dyr og fugler- 395

Prosedyre for fôring-254

Prosedyre for sulting matfisk- 230

Prosedyre for førmottak og -lagring- 260

Prosedyre for bruk av legemidler og håndtering av legemiddelrest og -avfall-191

Prosedyre for daglig røkting av rognkjeks-293

Holde patogener ute

Formål:

Sikre at smitte ikke blir introdusert til anleggene våre

Forebyggende tiltak:

- Unødig bruk av eksternt utstyr og båter skal unngås
- Utstyr og båter som skal tas inn i anlegget skal være tilstrekkelig rengjort og desinfisert
- Besøk til anlegget skal være avtalt og avklart på forhånd og besøkende skal benytte seg av lokalitetens egne klær og eget utstyr dersom de skal ut på mærene
- Biologisk materiale skal ikke tas inn i eller ut fra anlegget

Korrigerende tiltak:

- Beredskapsplanverk

Ansvar:

Driftsleder

Prosedyre – dokumentnummer

Samme referanser som nevnt under biosikkerhet

Minimalisere spredning av sykdom internt i anlegget
Formål: Tilstrekkelig renhold og hygiene, samt fornuftig dødelighetshåndteringer viktig for å holde fisken frisk og eksponert for så lite smitte som mulig Forebyggende tiltak: • Unødig bruk av eksternt utstyr og båter skal unngås • Utstyr og båter som skal tas inn i anlegget skal være tilstrekkelig rengjort og desinfisert • Besøk til anlegget skal være avtalt og avklart på forhånd og besøkende skal benytte seg av lokalitetens egne klær og eget utstyr dersom de skal ut på mærene • Biologisk materiale skal ikke tas inn i eller ut fra anlegget Korrigerende tiltak: • Beredskapsplanverk Ansvar: Driftsleder Prosedyre – dokumentnummer Samme referanser som nevnt under biosikkerhet

Sykdomsutbrudd/akutt dødelighet
Formål: Sikre at man håndterer utbrudd av sykdom eller akutt dødelighet effektivt slik at det får minst mulig konsekvens for resten av fisken i anlegget, nærliggende anlegg og villfisk Forebyggende tiltak: • Holde fisken sunn • Holde patogener ute, kontroll på smitte fra settefisk • God vannkvalitet • Overvåking av fiskehelsestatus Korrigerende tiltak: • Frekvensen på røkting av dødfisk og svimere økes • Ledelsen, Mattilsynet, Fiskehelsepersonell og andre aktører varsles • Årsaksforhold oppklares • All unødig trafikk inn og ut av anlegg og håndtering av fisk unngås • Syk fisk skal ikke flyttes • Renholdsplan - nivå gul/rød • Beredskapsplanverk • Medikamentell behandling iverksettes hvis dette er nødvendig • Enheter med smitte, sykdom og høy dødelighet isoleres, blir vurdert nødslaktet eller destruert/sanert avhengig av årsak og omfang Ansvar: Driftsleder, leder sjø, leder fiskehelse, regionansvarlig fiskehelse Prosedyre – dokumentnummer Samme referanser som nevnt under biosikkerhet

Vannkvalitet
Formål: God vannkvalitet og god kontroll på vannparametere er en forutsetning for god fiskehelse og velferd
Forebyggende tiltak: • Vannkvalitet, dvs temperatur, salinitet, alger, maneter og begroing skal overvåkes regelmessig og minimum i hht myndighetskrav • Varsle linjeleder ved observasjon av misfarging av havet og forekomst av unormalt store mengder maneter • Nøtene skal rengjøres regelmessig, alt etter behov
Korrigerende tiltak: • Beredskapsplanverk • Frekvens på røkting av dødfisk og svimere økes • Fôringen stoppes, justeres ned eller forskyves til annet tidspunkt på døgnet, alt etter årsak • Om relevant prøvetas vannet for å oppklare årsaksforhold
Ansvar: Driftsleder
Prosedyre – dokumentnummer Beredskapsplan for Cermaq Norway - 1154

Virussykdommer: IPN, PD, ILA, HSMB, CMS Bakteriesykdommer: Furunkulose, Vibriose, Kaldtvannsvibriose, Vintersår, Tenacibaculose

Formål:

Redusere omfanget av smitte av bakterie- og virussykdommer

Forebyggende tiltak:

- Smolten skal ved utsett være vaksinert med godkjent vaksine mot IPNV, furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose og vintersår forårsaket av *Moritella viscosa*
- Holde fisken sunn
- Holde patogener ute og kontrollere smittestatus på settefisk
- God vannkvalitet, overvåke vannkvaliteten
- Overvåke fiskehelsestatus
- Overvåke sykdomsagens som bestemt av myndighetene
 - Månedlig screening av 20 stk. fisk for PD-virus i overvåkingssone
 - Månedlig screening av minimum 10 stk. fisk for ILAV i overvåkingssone

Korrigerende tiltak:

- Frekvensen på røkting av dødfisk og svimere økes
- Ledelsen, Mattilsynet, Fiskehelsepersonell og andre aktører varsles
- Årsaksforhold oppklares
- All unødig trafikk inn og ut av anlegg og håndtering av fisk unngås
- Syk fisk skal ikke flyttes
- Renholdsplan – nivå gul/rød
- Beredskapsplanverk
- Medikamentell behandling iverksettes etter indikasjon hvis strengt nødvendig
- Enheter med smitte, sykdom og høy dødelighet isoleres, blir vurdert nødslaktet eller destruert/sanert avhengig av årsak og omfang

Ansvar:

Driftsleder, leder sjø, leder fiskehelse, regionansvarlig fiskehelse

Prosedyre – dokumentnummer

Samme referanser som under biosikkerhet

Kontroll på lakselus og skottelus

Formål:

Ha oversikt over og kontroll på parasittstatus i anlegget

Forebyggende tiltak:

- Lakselus og skottelus skal telles ukentlig på 20 fisk fra hver merd og registreres i Fishtalk. .

Ved sjøtemperatur under 4 °C kan det telles annenhver uke og i perioden fra uke 1-18 kan det telles på 10 fisk per merd

Personell som teller lus, skal ha gyldig opplæring

- Samme som under overvåking av fiskehelsestatus
- Luseskjørt
- Påslagshemmende fôr kan kun brukes etter avtale med produksjonsledelsen og i samråd med Fiskehelsepersonell

Korrigerende tiltak:

- Før nivå av kjønnsmodne hunnlus når 0,5 i perioden uke 27-20 eller 0,2 i perioden uke 21-26 iverksettes tiltak i enkeltmerder eller hele anlegget
- Tiltak mot skottelus iverksettes dersom helse og velferden til laksen er i fare
- Avlusning ved bruk av godkjente legemidler
- Avlusning ved bruk av ikke medikamentelle metoder

Ansvar:

Driftsleder, fiskehelsepersonell

Prosedyre – dokumentnummer

Samordnet plan for lusebekjempelse

Prosedyre for samordnet kontroll og bekjempelse lakselus- 394

Lakselusstadier oversikt, 961

Prosedyre for lusetelling- 321

Prosedyre for avlusning med bruk av legemidler-189

Risikovurdering lusebehandling, 1363

Prosedyre for bruk av legemidler og håndtering av legemiddelrest og -avfall- 191

Prosedyre for bekjempelse av lakselus med nedsatt følsomhet/resistens mot legemidler- 223

Prosedyre for rapportering lakselus- 348

Prosedyre for montering og bruk av luseskjørt, 241

Prosedyre for bruk av ikke medikamentelle metoder (IMM) i Cermaq Norway - 1214

Overvåking av fiskehelsestatus
Formål: Regelmessig overvåking av fisken for tegn på lidelser eller sykdom er kritisk for å ha kontroll med fiskens helsestatus Forebyggende tiltak: • Fiskens adferd, helse- og velferdsstatus skal overvåkes hver dag • All dødfisk skal klassifiseres etter dødelighetsårsak i Fishtalk etter veiledning fra fiskehelsepersonell og i samsvar med dødfiskveilederen • Lokaliteten skal ha regelmessige tilsyn med uttak av relevante prøver utført av autorisert fiskehelsepersonell Korrigerende tiltak: • Fiskehelsepersonell varsles ved episoder og akuttbesøk gjennomføres • Utvidet prøvetaking utføres for å oppklare årsaksforhold Ansvar: Driftsleder og fiskehelsepersonell Prosedyre – dokumentnummer Prosedyre for helsekontroll - 280 Beredskapsplan – 1154 Prosedyre for lusetelling – 321 Prosedyre for ivaretagelse av fiskevelferd og -helse - 1210

Dokumentasjon/ registreringer fiskehelse
Formål: Sikre at nedtegnelsen av fiskens helse og velferdsstatus på lokaliteten til enhver tid er sikret og tilgjengelig for personell på lokaliteten samt for annet relevant personell Forebyggende og korrigerende tiltak: • Dødelighet, destruksjon, dødelighetsårsak og behandlinger skal loggføres i Fishtalk. • Rapporter fra tilsynsførende fiskehelsepersonell, diagnoser og prøvesvar fra Veterinærinstituttet, PatoGen analyse og/eller andre godkjente laboratorier oppbevares på lokaliteten og skal være kjent av alt driftspersonell Ansvar: Driftsleder Prosedyre – dokumentnummer Prosedyre for helsekontroll Cermaq Norway AS- 280 Prosedyre for journalføring - 276 Helserapporter Screeningrapporter og andre prøvesvar Prosedyre for bruk av legemidler og håndtering av legemiddelrest og avfall - 191